

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

26 Juillet 1963

Supplément N°2 au bulletin du mois de Juillet.

ARBRES FRUITIERS

/Avertissement/

CARPOCAPSE

Les fortes températures enregistrées depuis quelques jours, ont favorisé l'activité des derniers papillons de la première génération et de nouvelles pontes ont été déposées.

Il convient de renouveler la protection insecticide en apportant beaucoup de soin à l'application du traitement. On opérera dès réception de l'avis.

TAVELURES (Pommiers et Poiriers)

Les traitements devront être renouvelés après chaque forte précipitation dans les seules plantations où des taches ont pu être constatées sur feuilles ou sur fruits (se reporter aux indications contenues dans notre bulletin du 27 Juin).

On pourra éventuellement ajouter un fongicide à la bouillie destinée à combattre le carpocapse, en tenant compte des possibilités de mélange des différents produits.

/Information/

ACARIENS

Surveiller le développement des foyers d'acariens, notamment sur prunier, de façon à pouvoir exécuter un traitement dès l'apparition des premiers symptômes. Utiliser un des produits figurant sur la liste remise à chaque abonné (rubrique Acariens des Arbres fruitiers) en tenant compte des restrictions d'emploi de certains d'entre eux, notamment à l'approche de la récolte.

OIDIUM DU POMMIER

On renouvelera la protection fongicide dans les vergers contaminés par cette maladie.

156

.../...

GRANDE CULTURE
- BETTERAVES SUCRIERES -

CERCOSPORIOSE

Les foyers primaires de Cercosporiose ont fait leur apparition. Les cultures de betteraves sucrières de variétés sensibles à cette maladie, devront être traitées avant le 31 Juillet.

On utilisera en pulvérisation (600 à 800 L. de bouillie à l'hectare) l'un des produits suivants :

- Oxychlorure de Cuivre : 6 kg à l'hectare
- Sulfate basique de Cuivre 50% de matière active : 5 kg à l'Ha
- Oxyde cuivreux : 4 à 5 kg à l'Ha, selon les spécialités
- un cupro-organique (Cuivre + Zinèbe) : 4 kg à l'Ha.

Ne pas oublier, le cas échéant, d'ajouter un mouillant à la bouillie.

Ne pas traiter les variétés résistantes à la Cercosporiose (P.A.3 - Cercopoly).

PEGOMYIE DE LA BETTERAVE

Des attaques localisées de Pégomyies sont observées sur betteraves. Il y a lieu de suivre attentivement l'évolution de ce parasite et d'intervenir en cas de nécessité.

Le traitement sera à réaliser lorsque l'on observera la fréquence de galeries sur les feuilles, en choisissant l'un des produits conseillés par la Station (se reporter au supplément N°3 du bulletin de Mai 1963).

CULTURES MARAICHIERES

TEIGNE DU POIREAU

Surveiller les cultures et intervenir dès l'observation des premiers dégâts. On peut utiliser le D.D.T. émulsion, le Prathion éthyle, le Parathion méthyle, le Diazinon, le Malathion.

MILDIOU DE LA TOMATE - SEPTORIOSE DU CELERI

Assurer une protection efficace de ces cultures en tenant compte des indications données dans notre supplément N°2 au bulletin du mois de Mai 1963.

Les traitements doivent être renouvelés en principe tous les 12 à 15 jours.

Les Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles,

J. BERNARD et C. GACHON

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. HARRANGER